

Mutatii

Genele, ca si cromozomii, sunt de obicei constante; totusi de mult s-a constatat ca apar, din cand in cand, la diferitele organisme, variatii bruste, mai mult sau mai putin evidente. Aceste variatii, denumite mutatii, se datoreaza fie schimbarii unei singure gene, fie schimbarii cromozomilor intregi sau a unor segmente ale acestora. Unele dintre aceste schimbari bruste, devenite imediat ereditare la urmasii directi, s-au observat inca de multa vreme. Din exemplele mai vechi de mutatii merita a fi citate urmatoarele:

a) *Oile pitice de Ancona*. In 1791 a aparut la ferma lui Seth Wright din Massachusetts in Statele Unite un berbec remarcabil prin trupul lung si picioarele scurte. Deoarece oile din rasa comuna, neameliorata sareau adesea tarcurile lor, pricinuind din aceasta cauza certuri intre vecini, crescatorul Wright a folosit aceasta mutatie in incrucisarile cu rasa comuna si a reusit sa creeze o noua rasa de oi pitice denumite de *Ancona*, care a fost folositoare din punct de vedere practic, pana cand a devenit de prisos prin introducerea in regiune a blandei oi din rasa *Merinos*. Mai tarziu aceeasi mutatie a aparut din nou, fiind descoperita de *Wriedt* in Norvegia.

b) *Chelidonium laciniatum*, planta cu foile adanc penate, aparuta dintr-o data din *Chelidonium majus* in anul 1590 in culturile farmacistului Sprenger din Heidelberg; forma noua s-a dovedit constanta si se gaseste azi reprezentata in toate gradinile botanice.

c) *Graul Squarehead*. Intr-un lan de grau din Anglia a fost observata o planta de grau cu spicul mare si de o forma foarte ciudata; in timp ce spicile celelalte se subtiu catre varf, spicile acestei plante erau foarte dese la varf si de forma aproape patratica; inmultita si urmarita separat planta aceasta a dat nastere soiului *Squarehead*, care s-a dovedit ca foarte productiv si s-a raspandit in tot vestul Europei.

d) *Datura inermis* (ciunafaia fara spini) gasita de *Gordon* in anul 1871 si aparuta ca mutatie din *Datura stramonium*. Cele mai multe mutatii s-au intalnit, insa, la plantele ornamentale; ele au fost de asemenea observate in numar mare la pomi fructiferi, vita de vie, legume precum si la arbori. Astfel Korschinski (1900) citeaza cazuri de aparitia varietatii "pendula" la numeroase specii de arbori ca de exemplu: *Sophora japonica*, *Gleditschia triacanthos*, *Prunus Mahaleb*, *Prunus padus*, *Quercus sessiliflora*, *Larix europca*, *Fraxinus excelsior*.. Mutatii au fost observate de-a lungul secolelor, inca din antichitate si anumite animale domestice, la caini si porumbei mai adesea, mai rar la bovine, ovine si porcine, cele mai putine intalnindu-se la cai. Prezenta numeroaselor rase de animale domestice este o dovada certa a inaltei frecvente a mutatiilor.

Darwin a descris multe din aceste cazuri, mentionand, de asemenea, si numeroasele mutatii in ceea ce priveste culorile penajului aparute la canari si pasari domestice, precum si atragatoarele schimbari observate la pestii aurii, in privinta culorii.

Multe mutatii, majoritatea monstruoze, au fost semnalate de diferiti autori si la oameni: citam aici, de exemplu, polidactilia (rezenta de degete suplimentare) si sindactilia (contopirea degetelor), lipsa falangelor, frecventa si lungimea parului de pe corp, piticism, nas si barbie spintecata. Dar si la animalele salbatice au fost observate mutatii, ca de exemplu randunici albe, cerbi cu un singur corn etc...

Nu se cunosc pana acum cauzele care au provocat si continua sa provoace aparitia mutatiilor in natura; multi cercetatori insa s-au straduit sa gaseasca mijloace de producere artificiala a lor. Astfel, in anul 1927 **Muller** a reusit sa provoace artificial, la *Drosophila*, aparitia de mutatii si anume prin actiunea razelor Roentgen. Prin iradiatii rata mutatiilor s-a ridicat la *Drosophila* de la

0,2% (spontan) la peste 13%. El a introdus astfel în genetica o nouă metodă de lucru, începutul unei noi ramuri a geneticii, denumita radiogenetica.

Actiunea provocatoare de mutatii a razelor Roentgen a fost confirmata scurt timp după aceea de **Gager** și **Blakeslee** la *Datura* și de **Stadler** (1928) la porumb. La câteva timp după executarea acestor experiente, s-a reușit să se provoace mutatii și prin lumina ultravioletă precum și prin alte iradiieri ionizante decât razele Roentgen, și anume cu raze α , β , γ , neutroni etc. precum și prin temperatură. Dintre factorii mutageni fizici, cea mai mare eficientă o au *radiatiile ionizante* (radiatiile corpusculare – electroni, protoni, neutroni, deutroni, particule alfa – care și radiatiile electromagnetice de mare energie – radiatiile gamma și Roentgen). Razele gamma se întâlnesc în natură: ele sunt analoage rezelor X, dar mult mai patruncătoare și de lungime de unde mai mică, având o actiune fiziologică puternică. Iradiierile s-au dovedit ca exercită două feluri de acțiuni și anume:

- o acțiune primară fizică, directă asupra genei, razele schimbând sau distrugând o parte din materialul genetic.

- o acțiune secundară, radiochimică, indirectă, prin transformarea apei în peroxizi de hidrogen, care la randul lor acționează asupra materialului genetic.

Expunerea la raze X și la alte forme de particule de înaltă energie poate provoca atât apariția de mutatii complet analoage mutatiilor genice, ce se obțin în natură, cât și de mutatii structural-cromozomale; acestea din urmă sunt datorate fie inhibării diviziunii celulei, fie ruperii cromozomilor, fapt ce cauzează rearanjamente ale cromozomilor și anomalii la mitoza și meioza.

Factorii care influențează cel mai mult numărul de mutatii aparute prin acțiunea radiatiilor sunt urmatorii:

- *Doza de iradiere*. Numărul mutatiilor crește, în general, proporțional cu doza radiatiei aplicate; în schimb durata iradiării are importanță redusă; astfel într-o experiență cu *Drosophila* iradierea cu o doză totală de 2000 roentgeni a dat același număr de mutatii într-un minut ca și la 20 de minute. Totuși în unele experiente fractionarea a produs efecte mutagene mai slabe decât aceeași doză aplicată o singură dată.

- *Tipul radiatiei*, neutronii având în comparație cu radiatia gamma o eficientă de cinci ori mai mare, iar neutronii rapizi, de 10-20 ori mai mare; la unele plante ei o pot depăși chiar de 100 de ori.

- *Specia, respectiv varietatea iradiată*. Plantele care poseda un număr mic de cromozomi, sunt mai radiosensibile în timp ce plantele cu un număr mare de cromozomi sunt mai radiorezistente. Cercetările au arătat că există "o înclinare naturală" a unor specii, varietăți și soiuri de a produce mutatii induse mai mult decât altele; spectrul mutatiilor depinde, asadar, de constitutia genetica a biotipului, respectiv speciei iradiate. Astfel, s-a determinat că spectrele mutatiilor clorofiliene sunt marcate diferențial la speciile de grau diploide, tetraploide și hexaploide (MacKey 1967).

- *Lungimea differita a genelor*, genele mai lungi oferind tinte mai mari de atac din partea agentilor mutageni.

- *Viteza diviziunii celulare si marimer nucleului*, iradierea fiind mai eficientă în timpul meiozei, din cauza incetinirii ciclului și măririi volumului nucleului.

- *Continutul de apa al tesuturilor iradiate*, rata mutatiilor fiind mult mai mare, de exemplu la semintele umectate decât la cele uscate, ceea ce demonstrează rolul apei în acțiunea mutagena indirectă.

- *Temperatura*, temperaturile înalte reducând, la acțiunea razelor X, frecvența mutatiilor genice letale și a translocatiilor.

- *Continutul de oxigen*, o concentrație mare de oxigen marind semnificativ numărul

mutatiilor si aberatiilor cromozomiale.

Din practica inducerii mutatiilor si aberatiilor cromozomale a rezultat un fapt deosebit de important si anume ca unul si acelasi caracter este influentat de mutatii aparute in numerosi loci; astfel la orz, caracterul *eceriferum* este influentat de macromutatii aparute in peste 100 de loci (Lundqvist 1967).

Merita sa fie relevat un efect important al radiatiilor asupra celulei si anume *inhibitia mitozei*. Astfel, unele celule ca cele umane, care-si parcurg in conditii obisnuite intregul ciclu de diviziune celulara in 18-20 ore, isi prelungesc, prin iradiere cu 26-90 roentgeni, aceasta durata pana la 65 ore. Perturbarea mecanismului diviziunii se manifesta uneori si in modificarea numarului de cromozomi.

Succese in obtinerea de mutatii prin tratarea cu raze s-au obtinut la foarte multe organisme (*Drosophila*, soareci, porumb, orz, tomate, etc.). Majoritatea mutatiilor induse artificial sunt asemanatoare celor aparute spontan, fapt constatat de Scholz (1959) la orz, de Stubbe (1957) la tomate, plante la care s-a putut reconstitui intreaga gama de variatii existente in natura.

Dintre *radiatiile neionozate*, razele ultraviolete (U.V.) sunt singurele capabile sa produca mai multe mutatii decat cele ce apar spontan. Din rezultatele obtinute prin tratarea cu U.V. s-a conchis ca: a) se obtin numai rareori schimbari structurale mari ale cromozomilor; b) cel mai mare efect mutagen se obtine la razele cu lungimea de unda de maxima absorbție a U.V. de catre acizii nucleici; de aici s-a tras concluzia ca actiunea mutagenica a U.V. este datorita absorbției radiatiei de catre ADN din cromozomi (Williams 1964).

Mutatiile sunt mult folosite in studiile genetice. Prin studiu mutatiilor spontane sau induse s-a putut afla mai mult despre structura intima a genei, despre mecanismele ereditatii si varabilitatii.

Multe din mutatiile aparute la plantele cultivate si la animale au reprezentat progrese reale in anumite conditii de mediu sau pentru anumite cerinte. Au aparut mutante din care s-au dezvoltat soiuri si rase valoroase; astfel multe soiuri la plantele agricole si pomi isi datoreaza aparitia descoperirii mutatiilor. Citam de exemplu strugurii fara sambure, piersicile de mari dimensiuni, capsurile fin aromate, animalele producatoare de blanuri deosebit de variate si atragatoare.

O perspectiva larga pentru aparitia de mutatii valoroase se deschide prin metoda inducerii mutatiilor; un exemplu stralucit il constituie cresterea considerabila a productiei de penicilina la ciuperca *Penicillium* datorita obtinerii de variante mai productive aparute ca mutatii induse prin iradierea a milioane de spori.

Bibliografie:

N. Giosan, N. A. Saulescu, *Principii de genetica*, Editura Agrosilvica, Bucuresti, 1969